



Handelsbezeichnung	Thiovit Jet
Registernummer	2632-0
Art der Zubereitung	Wasserdispersierbares Granulat (WG)
Wirkungstyp	Akarizid, Fungizid

Wirkstoffe

Wirkstoff	Wirkstoffgehalt rein	Einheit	Gew. %	Zusätzliche Angaben	Wirkstoffgruppe
Schwefel	800	g/kg			FRAC (M02), IRAC (UN)

ZulassungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
Syngenta Agro GmbH. Zweigniederlassung Österreich	Anton-Baumgartner-Straße 125/2/3/1 1230 Wien, Österreich

GenehmigungsinhaberIn

Name (Firma)	Anschrift
--------------	-----------

VertriebsunternehmerIn gem. § 13 PSM-VO 2011

Name (Firma)	Anschrift
--------------	-----------

Für die Endkennzeichnung Verantwortliche

Name (Firma)	Anschrift
Syngenta Agro GmbH. Zweigniederlassung Österreich	Anton-Baumgartner-Straße 125/2/3/1 1230 Wien, Österreich

Status	zugelassen
Beginn der Zulassung	23.12.1998
Datum der letzten Änderung	24.01.2025
Antrag auf Erneuerung	02.07.2003
Datum der letzten Erneuerung	04.08.2014
Ende der Zulassung	15.04.2026
Abverkaufsfrist	
Aufbrauchsfrist	

Zugelassene Indikationen

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
1	Ackerbau	<ul style="list-style-type: none"> Hafer (3OATC) Gerste (3BARC) Triticale (3TRIC) Weizen (3WHEC) Roggen (3RYEC) Dinkel (3SPEC) 	<ul style="list-style-type: none"> Echter Mehltau (Erysiphe graminis) Zur Befallsminderung 	Freiland		Nein	Nein	Nein	
2	Weinbau	<ul style="list-style-type: none"> Weinreben (VITVI) 	<ul style="list-style-type: none"> Echter Mehltau (Oidium) (UNCINE, Erysiphe necator) 	Freiland		Nein	Nein	Nein	
3	Weinbau	<ul style="list-style-type: none"> Weinreben (VITVI) 	<ul style="list-style-type: none"> Echter Mehltau (Oidium) (UNCINE, Erysiphe necator) 	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		



Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
4	Weinbau	• Weinreben (VITVI)	<ul style="list-style-type: none"> Pockenmilbe (ERPHVI, Eriophyes vitis) Zur Befallsminderung Kräuselmilbe (EPITVI, Calepitrimerus vitis) Zur Befallsminderung 	Freiland	Nein	Ja	Nein		
5	Weinbau	• Weinreben (VITVI)	<ul style="list-style-type: none"> Pockenmilbe (ERPHVI, Eriophyes vitis) Zur Befallsminderung Kräuselmilbe (EPITVI, Calepitrimerus vitis) Zur Befallsminderung 	Freiland	Nein	Ja	Nein		
6	Obstbau	• Birne (PYUCO)	<ul style="list-style-type: none"> Birnenpockenmilbe (ERPHPI, Eriophyes piri) Zur Befallsminderung 	Freiland	Nein	Ja	Nein		
7	Obstbau	• Kernobst (3PMFC)	<ul style="list-style-type: none"> Schorf (VENTSP, Venturia sp.) Zur Befallsminderung, mit befallsmindernder Wirkung gegen Spinnmilben 	Freiland	Nein	Nein	Nein		
8	Obstbau	• Kernobst (3PMFC)	<ul style="list-style-type: none"> Schorf (VENTSP, Venturia sp.) Zur Befallsminderung, mit befallsmindernder Wirkung gegen Spinnmilben 	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
9	Obstbau	• Kernobst (3PMFC)	<ul style="list-style-type: none"> Echter Mehltau (PODOLE, Podosphaera leucotricha) Mit befallsmindernder Wirkung gegen Spinnmilben 	Freiland	Nein	Nein	Nein		
10	Obstbau	• Kernobst (3PMFC)	<ul style="list-style-type: none"> Echter Mehltau (PODOLE, Podosphaera leucotricha) Mit befallsmindernder Wirkung gegen Spinnmilben 	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
11	Obstbau	• Stachelbeeren (RIBUC)	<ul style="list-style-type: none"> Amerikanischer Stachelbeermehltau (SPHRMU, Podosphaera mors-uvae) 	Freiland	Nein	Ja	Nein		
12	Obstbau	• Stachelbeeren (RIBUC)	<ul style="list-style-type: none"> Amerikanischer Stachelbeermehltau (SPHRMU, Podosphaera mors-uvae) 	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Ja	Nein		
13	Gemüsebau	• Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	<ul style="list-style-type: none"> Echter Mehltau (ERYSPI, Erysiphe pisi) 	Freiland	Nein	Ja	Nein		
14	Gemüsebau	• Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	<ul style="list-style-type: none"> Echter Mehltau (ERYSPI, Erysiphe pisi) 	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Ja	Nein		
15	Gemüsebau	• Gurke (CUMSA)	<ul style="list-style-type: none"> Echter Mehltau (Golovinomyces (Erysiphe) cichoracearum, Podosphaera (Sphaerotheca) fulginea) 	Freiland	Nein	Nein	Nein		
16	Gemüsebau	• Gurke (CUMSA)	<ul style="list-style-type: none"> Echter Mehltau (Golovinomyces (Erysiphe) cichoracearum, Podosphaera (Sphaerotheca) fulginea) 	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		



Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
17	Hopfenbau	• Hopfen (HUMLU)	• Echter Mehltau (SPHRMA, Podosphaera macularis)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
18	Forst	• Eiche (QUESS) Sämlinge und Jungpflanzen	• Echter Mehltau (MCRSAL, Microsphaera alphitoides)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
19	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Echte Mehltapilze (PODOSP, Podosphaera sp.)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
20	Zierpflanz enbau	• Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	• Echte Mehltapilze (PODOSP, Podosphaera sp.)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Ja	Nein		
21	Gemüsebau	• Topinambur (HELTU) • Schwarzwurzel (SCVHI) • Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) (3RSBC) • Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) (3UMRC) • Süßkartoffel (IPOBA) • Haferwurzel (Weißwurzel) (TROPS) • Orientalischer Bocksbart (TROPO) • Rote Rüben (3BERC)	• Echte Mehltapilze (PODOSP, Podosphaera sp.)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
22	Gemüsebau	• Topinambur (HELTU) • Schwarzwurzel (SCVHI) • Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) (3RSBC) • Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) (3UMRC) • Süßkartoffel (IPOBA) • Haferwurzel (Weißwurzel) (TROPS) • Orientalischer Bocksbart (TROPO) • Rote Rüben (3BERC)	• Echte Mehltapilze (PODOSP, Podosphaera sp.)	Haus- und Kleingartenbereich: Freiland	Ja	Nein	Nein		
23	Ackerbau	• Zuckerrübe (BEAVA)	• Echter Mehltau (ERYSBE, Erysiphe betae)	Freiland	Nein	Nein	Nein		
24	Gemüsebau	• Paprika (CPSAN) • Melanzani (Auberginen) (SOLME) • Tomaten (LYPES)	• Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
25	Gemüsebau	• Paprika (CPSAN) • Melanzani (Auberginen) (SOLME) • Tomaten (LYPES)	• Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
26	Gemüsebau	• Zucchini (CUUPG) • Garten-Kürbis (CUUPE) • Patisson (CUUPM) • Gurke (CUMSA) • Melonen (CUMME) • Riesenkürbis (CUUMA) • Kürbis-Hybriden (CUUHY) • Moschuskürbis (CUUMO)	• Echter Mehltau (PODOSP, Podosphaera sp.) • Echter Mehltau (GOLOSP, Golovinomyces sp.)	Freiland	Nein	Ja	Nein		
27	Gemüsebau	• Zucchini (CUUPG) • Garten-Kürbis (CUUPE) • Patisson (CUUPM) • Gurke (CUMSA) • Melonen (CUMME) • Riesenkürbis (CUUMA) • Kürbis-Hybriden (CUUHY) • Moschuskürbis (CUUMO)	• Echter Mehltau (PODOSP, Podosphaera sp.) • Echter Mehltau (GOLOSP, Golovinomyces sp.)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		



Pflanzenschutzmittelregister - Registerauszug

Daten zuletzt aktualisiert am: 27.01.2025 23:45

Öffentlicher Teil gemäß §5 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011, BGBl. II Nr. 233

Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
28	Gemüsebau	<ul style="list-style-type: none"> • Feuerbohne (Käferbohne) (PHSCO) • Stangenbohne (PHSVX) • Buschbohne (PHSVN) • Linse (LENCU) • Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX) Trocken • Mondbohne (Limabohne) (PHSLU) 	<ul style="list-style-type: none"> • Echter Mehltau (PODOSP, Podosphaera sp.) • Echter Mehltau (ERYSSP, Erysiphe sp.) 	Freiland	Nein	Ja	Nein		
29	Gemüsebau	<ul style="list-style-type: none"> • Feuerbohne (Käferbohne) (PHSCO) • Stangenbohne (PHSVX) • Buschbohne (PHSVN) • Linse (LENCU) • Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX) • Mondbohne (Limabohne) (PHSLU) 	<ul style="list-style-type: none"> • Echter Mehltau (PODOSP, Podosphaera sp.) • Echter Mehltau (ERYSSP, Erysiphe sp.) 	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
30	Gemüsebau	<ul style="list-style-type: none"> • Chicoree (inkl. Zuckerhut, Radicchio) (CICIF) 	<ul style="list-style-type: none"> • Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) Zur Befallsminderung 	Freiland	Nein	Ja	Nein		
31	Gemüsebau	<ul style="list-style-type: none"> • Chicoree (inkl. Zuckerhut, Radicchio) (CICIF) 	<ul style="list-style-type: none"> • Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) Zur Befallsminderung 	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
32	Obstbau	<ul style="list-style-type: none"> • Erdbeeren (FRAAN) 	<ul style="list-style-type: none"> • Echter Mehltau (PODOAP, Podosphaera aphanis) Zur Befallsminderung 	Freiland	Nein	Ja	Nein		
33	Obstbau	<ul style="list-style-type: none"> • Rosen (1ROSG) Heckenrosen • Himbeeren (RUBID) • Preiselbeeren (VACVI) • Kultur-Heidelbeere (VACCO) • Johannisbeerartiges Beerenobst (3RIBC) • Loganbeeren (RUBLO) 	<ul style="list-style-type: none"> • Echter Mehltau (PODOSP, Podosphaera sp.) 	Freiland	Nein	Ja	Nein		
34	Gemüsebau	<ul style="list-style-type: none"> • Kräuter (3HERC) 	<ul style="list-style-type: none"> • Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera sp.) 	Freiland	Nein	Ja	Nein		
35	Obstbau	<ul style="list-style-type: none"> • Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE) • Süßkirsche (PRNAV) • Marillen (PRNAR) • Pflaumen (Zwetschken) (PRNDO) 	<ul style="list-style-type: none"> • Echter Mehltau (PODOTR, Podosphaera tridactyla) 	Freiland	Nein	Ja	Nein		
36	Obstbau	<ul style="list-style-type: none"> • Nektarinen (PRNPN) • Pfirsiche (PRNPS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Echter Mehltau (SPHRPA, Podosphaera pannosa) 	Freiland	Nein	Ja	Nein		
37	Obstbau	<ul style="list-style-type: none"> • Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE) • Nektarinen (PRNPN) • Süßkirsche (PRNAV) • Pfirsiche (PRNPS) • Marillen (PRNAR) • Pflaumen (Zwetschken) (PRNDO) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schrotschusskrankheit (STIGCA, Stigmia carpophila) 	Freiland	Nein	Ja	Nein		
38	Gemüsebau	<ul style="list-style-type: none"> • Karotten (DAUCS) • Knollensellerie (APUGR) • Pastinaken (PAVSA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Echter Mehltau (ERYSHE, Erysiphe heraclei) 	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
39	Gemüsebau	<ul style="list-style-type: none"> • Radieschen (Rettich) (RAPSR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Echter Mehltau (ERYSCR, Erysiphe cruciferarum) 	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		
40	Gemüsebau	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarzwurzel (SCVHI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum) 	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		



Nr.	Einsatzgebiet	Kultur/Objekt + Einschränkung	Schadfaktor + Einschränkung	Anwendungsbereich	HuK	Art. 51	Art. 53	Befristung von	Befristung bis
41	Gemüsebau	• Rote Rübe (BEAVD)	• Echter Mehltau (ERY5BE, Erysiphe betae)	Unter Glas	Nein	Ja	Nein		



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Piktogramm	Signalwort	H-Satz	Gefahrenhinweis
----------------	-------------------	------------	------------	--------	-----------------

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text	Betroffene Indikationen
P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.	
P501	Inhalt / Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.	

Ergänzende Gefahrenmerkmale

EUH-Satz	Text
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Betroffene Indikationen	
SP 1 - Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberfläche ngewässern reinigen / indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)	
SPe 4 - Zum Schutz von Gewässerorganismen bzw. Nichtzielpflanzen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.	
Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!	
Zum Schutz von Nicht-Ziel-Arthropoden ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 75% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.	6 - Birne (PYUCO)
Für die Haus- und Kleingartenanwendungen: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.	12 - Stachelbeeren (RIBUC), 14 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 16 - Gurke (CUMSA), 20 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 22 - Haferwurzel (Weißwurzel) (TROP), Orientalischer Bocksbart (TROPO), Rote Rüben (3BERC), Schwarzwurzel (SCVHI), Süßkartoffel (IPOBA), Topinambur (HELTU), Wurzel- und Knollengewüse Doldengewächse (Apiaceae) (3UMRC), Wurzel- und Knollengewüse Kreuzblütler (Brassicaceae) (3RSBC)
Zum Schutz von Nicht-Ziel-Arthropoden ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 90% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.	7 - Kernobst (3PMFC), 9 - Kernobst (3PMFC), 35 - Marillen (PRNAR), Pflaumen (Zwetschken) (PRNDO), Süßkirsche (PRNAV), Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE), 36 - Nektarinen (PRNPN), Pfirsiche (PRNPS), 37 - Marillen (PRNAR), Nektarinen (PRNPN), Pfirsiche (PRNPS), Pflaumen (Zwetschken) (PRNDO), Süßkirsche (PRNAV), Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE)



Betroffene Indikationen	
Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.	
Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.	
Zum Schutz von Nicht-Ziel-Arthropoden ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 50% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.	2 - Weinreben (VITVI), 17 - Hopfen (HUMLU), 19 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 33 - Himbeeren (RUBID), Johannisbeerartiges Beerenobst (3RIBC), Kultur-Heidelbeere (VACCO), Loganbeeren (RUBLO), Preiselbeeren (VACVI), Rosen (1ROSG)
Für Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich: Schädlich für Nützlinge.	3 - Weinreben (VITVI), 8 - Kernobst (3PMFC), 10 - Kernobst (3PMFC), 12 - Stachelbeeren (RIBUC), 14 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 16 - Gurke (CUMSA), 20 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 22 - Haferwurzel (Weißwurzel) (TROP), Orientalischer Bocksbart (TROPO), Rote Rüben (3BERC), Schwarzwurzel (SCVHI), Süßkartoffel (IPOBA), Topinambur (HELTU), Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) (3UMRC), Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) (3RSBC)
Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.	
Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.	

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen	
In Abhängigkeit von der Bestandsdichte und dem Entwicklungsstadium der Kulturpflanze werden folgende Aufwandmengen festgelegt:	3 - Weinreben (VITVI)
Aufwandmengen	
Menge von	Menge bis
1500	4000
Einheit	Stadium
g/ha	Bis Stadium 61 (Austrieb bis Beginn der Blüte)
2500	6000
g/ha	Bis Stadium 71 (bis Fruchtausatz)
4000	8000
g/ha	Ab Stadium 71 (Fruchtausatz)
In Abhängigkeit von der Bestandsdichte und dem Entwicklungsstadium der Kulturpflanze werden folgende Aufwandmengen festgelegt:	2 - Weinreben (VITVI)
Aufwandmengen	
Menge von	Menge bis
2.5	6
Einheit	Stadium
kg/ha	Bis Stadium 71 (bis Fruchtausatz)
4	8
kg/ha	Ab Stadium 71 (Fruchtausatz)
1.5	4
kg/ha	Bis Stadium 61 (Austrieb bis Beginn der Blüte)

Sonstige Auflagen und Hinweise

Betroffene Indikationen	
Insgesamt nicht mehr als 10 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.	2 - Weinreben (VITVI), 3 - Weinreben (VITVI), 4 - Weinreben (VITVI), 5 - Weinreben (VITVI), 17 - Hopfen (HUMLU), 35 - Marillen (PRNAR), Pflaumen (Zwetschken) (PRNDO), Süßkirsche (PRNAV), Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE), 36 - Nektarinen (PRNPN), Pfirsiche (PRNPS), 37 - Marillen (PRNAR), Nektarinen (PRNPN), Pfirsiche (PRNPS), Pflaumen (Zwetschken) (PRNDO), Süßkirsche (PRNAV), Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE)
Insgesamt nicht mehr als 3 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.	1 - Dinkel (3SPEC), Gerste (3BARC), Hafer (3OATC), Roggen (3RYEC), Triticale (3TRIC), Weizen (3WHEC), 13 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 14 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 18 - Eiche (QUESS), 32 - Erdbeeren (FRAAN), 34 - Kräuter (3HERC)



Betroffene Indikationen	
Insgesamt nicht mehr als 14 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.	6 - Birne (PYUCO), 7 - Kernobst (3PMFC), 8 - Kernobst (3PMFC), 9 - Kernobst (3PMFC), 10 - Kernobst (3PMFC)
Bei Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen können nach der Anwendung Schäden an den Kulturpflanzen auftreten.	
In Abhängigkeit von Kultur, Sorte und dem Anbauverfahren können Schäden an der zu behandelnden Kultur nicht ausgeschlossen werden. Vor einem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.	21 - Haferwurzel (Weißwurzel) (TROPS), Orientalischer Bocksbart (TROPO), Rote Rüben (3BERC), Schwarzwurzel (SCVHI), Süßkartoffel (IPOBA), Topinambur (HELTU), Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) (3UMRC), Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) (3RSBC), 22 - Haferwurzel (Weißwurzel) (TROPS), Orientalischer Bocksbart (TROPO), Rote Rüben (3BERC), Schwarzwurzel (SCVHI), Süßkartoffel (IPOBA), Topinambur (HELTU), Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) (3UMRC), Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) (3RSBC)
Klassifikation des/der Wirkstoffe(s) gemäß Fungicide Resistance Action Committee (FRAC): Wirkmechanismus (FRAC CODE): M2.	
Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.	4 - Weinreben (VITVI), 5 - Weinreben (VITVI), 6 - Birne (PYUCO), 11 - Stachelbeeren (RIBUC), 12 - Stachelbeeren (RIBUC), 13 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 14 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 17 - Hopfen (HUMLU), 18 - Eiche (QUESS), 19 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 20 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 23 - Zuckerrübe (BEAVA), 24 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), Paprika (CPSAN), Tomaten (LYPES), 25 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), Paprika (CPSAN), Tomaten (LYPES), 26 - Garten-Kürbis (CUUPE), Gurke (CUMSA), Kürbis-Hybriden (CUUHY), Melonen (CUMME), Moschuskürbis (CUUMO), Patisson (CUUPM), Riesenkürbis (CUUMA), Zucchini (CUUPG), 27 - Garten-Kürbis (CUUPE), Gurke (CUMSA), Kürbis-Hybriden (CUUHY), Melonen (CUMME), Moschuskürbis (CUUMO), Patisson (CUUPM), Riesenkürbis (CUUMA), Zucchini (CUUPG), 28 - Buschbohne (PHSVN), Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), Feuerbohne (Käferbohne) (PHSCO), Linse (LENCU), Mondbohne (Limabohne) (PHSLU), Stangenbohne (PHSVX), 29 - Buschbohne (PHSVN), Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), Feuerbohne (Käferbohne) (PHSCO), Linse (LENCU), Mondbohne (Limabohne) (PHSLU), Stangenbohne (PHSVX), 30 - Chicoree (inkl. Zuckerhut, Radicchio) (CICIF), 31 - Chicoree (inkl. Zuckerhut, Radicchio) (CICIF), 32 - Erdbeeren (FRAAN), 33 - Himbeeren (RUBID), Johannisbeerartiges Beerenobst (3RIBC), Kultur-Heidelbeere (VACCO), Loganbeeren (RUBLO), Preiselbeeren (VACVI), Rosen (1ROSG), 34 - Kräuter (3HERC), 35 - Marillen (PRNAR), Pflaumen (Zwetschken) (PRNDO), Süßkirsche (PRNAV), Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE), 36 - Nektarinen (PRNPN), Pfirsiche (PRNPS), 37 - Marillen (PRNAR), Nektarinen (PRNPN), Pfirsiche (PRNPS), Pflaumen (Zwetschken) (PRNDO), Süßkirsche (PRNAV), Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE), 38 - Karotten (DAUCS), Knollensellerie (APUGR), Pastinaken (PAVSA), 39 - Radieschen (Rettich) (RAPSR), 40 - Schwarzwurzel (SCVHI), 41 - Rote Rübe (BEAVD)
Negative Einflüsse auf den Geschmack bei Tafeltrauben können nicht ausgeschlossen werden.	2 - Weinreben (VITVI), 3 - Weinreben (VITVI), 5 - Weinreben (VITVI)
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.	19 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 20 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC)
Insgesamt nicht mehr als 6 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.	11 - Stachelbeeren (RIBUC), 12 - Stachelbeeren (RIBUC), 15 - Gurke (CUMSA), 16 - Gurke (CUMSA), 21 - Haferwurzel (Weißwurzel) (TROPS), Orientalischer Bocksbart (TROPO), Rote Rüben (3BERC), Schwarzwurzel (SCVHI), Süßkartoffel (IPOBA), Topinambur (HELTU), Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) (3UMRC), Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) (3RSBC), 22 - Haferwurzel (Weißwurzel) (TROPS), Orientalischer Bocksbart (TROPO), Rote Rüben (3BERC), Schwarzwurzel (SCVHI), Süßkartoffel (IPOBA), Topinambur (HELTU), Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) (3UMRC), Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) (3RSBC), 26 - Garten-Kürbis (CUUPE), Gurke (CUMSA), Kürbis-Hybriden (CUUHY), Melonen (CUMME), Moschuskürbis (CUUMO), Patisson (CUUPM), Riesenkürbis (CUUMA), Zucchini (CUUPG), 27 - Garten-Kürbis (CUUPE), Gurke (CUMSA), Kürbis-Hybriden (CUUHY), Melonen (CUMME), Moschuskürbis (CUUMO), Patisson (CUUPM), Riesenkürbis (CUUMA), Zucchini (CUUPG)



Betroffene Indikationen	
<p>Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.</p>	<p>2 - Weinreben (VITVI), 3 - Weinreben (VITVI), 5 - Weinreben (VITVI), 7 - Kernobst (3PMFC), 8 - Kernobst (3PMFC), 9 - Kernobst (3PMFC), 10 - Kernobst (3PMFC), 11 - Stachelbeeren (RIBUC), 12 - Stachelbeeren (RIBUC), 13 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 14 - Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), 15 - Gurke (CUMSA), 16 - Gurke (CUMSA), 17 - Hopfen (HUMLU), 21 - Haferwurzel (Weißwurzel) (TROPS), Orientalischer Bocksbart (TROPO), Rote Rüben (3BERC), Schwarzwurzel (SCVHI), Süßkartoffel (IPOBA), Topinambur (HELTU), Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) (3UMRC), Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) (3RSBC), 22 - Haferwurzel (Weißwurzel) (TROPS), Orientalischer Bocksbart (TROPO), Rote Rüben (3BERC), Schwarzwurzel (SCVHI), Süßkartoffel (IPOBA), Topinambur (HELTU), Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) (3UMRC), Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) (3RSBC), 23 - Zuckerrübe (BEAVA), 24 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), Paprika (CPSAN), Tomaten (LYPES), 25 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), Paprika (CPSAN), Tomaten (LYPES), 26 - Garten-Kürbis (CUUPE), Gurke (CUMSA), Kürbis-Hybriden (CUUHY), Melonen (CUMME), Moschuskürbis (CUUMO), Patisson (CUUPM), Riesenkürbis (CUUMA), Zucchini (CUUPG), 27 - Garten-Kürbis (CUUPE), Gurke (CUMSA), Kürbis-Hybriden (CUUHY), Melonen (CUMME), Moschuskürbis (CUUMO), Patisson (CUUPM), Riesenkürbis (CUUMA), Zucchini (CUUPG), 28 - Buschbohne (PHSVN), Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), Feuerbohne (Käferbohne) (PHSCO), Linse (LENCU), Mondbohne (Limabohne) (PHSLU), Stangenbohne (PHSVX), 29 - Buschbohne (PHSVN), Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), Feuerbohne (Käferbohne) (PHSCO), Linse (LENCU), Mondbohne (Limabohne) (PHSLU), Stangenbohne (PHSVX), 30 - Chicoree (inkl. Zuckerhut, Radicchio) (CICIF), 31 - Chicoree (inkl. Zuckerhut, Radicchio) (CICIF), 32 - Erdbeeren (FRAAN), 33 - Himbeeren (RUBID), Johannisbeerartiges Beerenobst (3RIBC), Kultur-Heidelbeere (VACCO), Loganbeeren (RUBLO), Preiselbeeren (VACVI), Rosen (1ROSG), 34 - Kräuter (3HERC), 35 - Marillen (PRNAR), Pflaumen (Zwetschken) (PRNDO), Süßkirsche (PRNAV), Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE), 36 - Nektarinen (PRNPN), Pfirsiche (PRNPS), 37 - Marillen (PRNAR), Nektarinen (PRNPN), Pfirsiche (PRNPS), Pflaumen (Zwetschken) (PRNDO), Süßkirsche (PRNAV), Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE), 38 - Karotten (DAUCS), Knollensellerie (APUGR), Pastinaken (PAVSA), 39 - Radieschen (Rettich) (RAPSR), 40 - Schwarzwurzel (SCVHI), 41 - Rote Rübe (BEAVD)</p>
<p>Bei berostungsempfindlichen Kernobstsorten sind niedrigere Aufwandmengen anzuwenden und Anwendungen während der Blüte zu vermeiden.</p>	<p>6 - Birne (PYUCO), 7 - Kernobst (3PMFC), 8 - Kernobst (3PMFC), 9 - Kernobst (3PMFC), 10 - Kernobst (3PMFC)</p>
<p>Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.</p>	<p>38 - Karotten (DAUCS), Knollensellerie (APUGR), Pastinaken (PAVSA), 39 - Radieschen (Rettich) (RAPSR), 40 - Schwarzwurzel (SCVHI), 41 - Rote Rübe (BEAVD)</p>
<p>Berostung bei empfindlichen Sorten möglich.</p>	<p>6 - Birne (PYUCO), 7 - Kernobst (3PMFC), 8 - Kernobst (3PMFC), 9 - Kernobst (3PMFC), 10 - Kernobst (3PMFC)</p>
<p>Insgesamt nicht mehr als 5 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.</p>	<p>24 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), Paprika (CPSAN), Tomaten (LYPES), 25 - Melanzani (Auberginen) (SOLME), Paprika (CPSAN), Tomaten (LYPES)</p>
<p>Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Jahr und Vegetationsperiode.</p>	<p>23 - Zuckerrübe (BEAVA), 28 - Buschbohne (PHSVN), Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), Feuerbohne (Käferbohne) (PHSCO), Linse (LENCU), Mondbohne (Limabohne) (PHSLU), Stangenbohne (PHSVX), 29 - Buschbohne (PHSVN), Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX), Feuerbohne (Käferbohne) (PHSCO), Linse (LENCU), Mondbohne (Limabohne) (PHSLU), Stangenbohne (PHSVX), 30 - Chicoree (inkl. Zuckerhut, Radicchio) (CICIF), 31 - Chicoree (inkl. Zuckerhut, Radicchio) (CICIF), 33 - Himbeeren (RUBID), Johannisbeerartiges Beerenobst (3RIBC), Kultur-Heidelbeere (VACCO), Loganbeeren (RUBLO), Preiselbeeren (VACVI), Rosen (1ROSG)</p>
<p>Insgesamt nicht mehr als 15 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.</p>	<p>19 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC), 20 - Zierpflanzenkulturen (3ORTC)</p>

Weitere Auflagen und Hinweise siehe oben.



Zusätzliche Angaben gem. § 5 Abs. 2 Z 5 und 6 Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 idgF.

Herkunftsmitgliedstaat

Handelsbezeichnung

Zulassungsnummer



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 1
Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Hafer (3OATC)	
Gerste (3BARC)	
Triticale (3TRIC)	
Weizen (3WHEC)	
Roggen (3RYEC)	
Dinkel (3SPEC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (<i>Erysiphe graminis</i>)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
7,5	kg/ha		200	400	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
	15	5-Blattstadium	69	Ende der Blüte

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 3
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7 - 21
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 35
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 3 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 2
Einsatzgebiet Weinbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weinreben (VITVI)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (Oidium) (UNCINE, Erysiphe necator)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
8	kg/ha	max.		1.000	l/ha	1000 l/ha (Berechnungsbasis) Berechnungsbasis

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	09	Knospenaufbruch: grüne Triebspitzen deutlich sichtbar	81	Beginn der Reife, Beeren beginnen hell zu werden (bzw. beginnen sich zu verfärben)

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 10
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen oder Sprühen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 28
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Nicht-Ziel-Arthropoden ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 50% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.

Sonstige Auflagen und Hinweise

In Abhängigkeit von der Bestandsdichte und dem Entwicklungsstadium der Kulturpflanze werden folgende Aufwandmengen festgelegt:

Aufwandmengen

Menge von	Menge bis	Einheit	Stadium
2.5	6	kg/ha	Bis Stadium 71 (bis Fruchtansatz)
4	8	kg/ha	Ab Stadium 71 (Fruchtansatz)
1.5	4	kg/ha	Bis Stadium 61 (Austrieb bis Beginn der Blüte)

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 10 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Negative Einflüsse auf den Geschmack bei Tafeltrauben können nicht ausgeschlossen werden.

Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 3
Einsatzgebiet Weinbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weinreben (VITVI)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (Oidium) (UNCINE, Erysiphe necator)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
80	g/100 m ²	max.		10	l/100 m ²	10 l/100 m ² (Berechnungsbasis) Berechnungsbasis

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	09	Knospenaufbruch: grüne Triebspitzen deutlich sichtbar	81	Beginn der Reife, Beeren beginnen hell zu werden (bzw. beginnen sich zu verfärben)

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 10
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 28
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich: Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

In Abhängigkeit von der Bestandsdichte und dem Entwicklungsstadium der Kulturpflanze werden folgende Aufwandmengen festgelegt:				
Aufwandsmengen	Menge von	Menge bis	Einheit	Stadium
	1500	4000	g/ha	Bis Stadium 61 (Austrieb bis Beginn der Blüte)
	2500	6000	g/ha	Bis Stadium 71 (bis Fruchtansatz)
	4000	8000	g/ha	Ab Stadium 71 (Fruchtansatz)

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 10 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Negative Einflüsse auf den Geschmack bei Tafeltrauben können nicht ausgeschlossen werden.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 4
Einsatzgebiet Weinbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weinreben (VITVI)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pockenmilbe (ERPHVI, Eriophyes vitis)	Zur Befallsminderung
Kräuselmilbe (EPITVI, Calepitrimerus vitis)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
7,5	kg/ha			1.000	l/ha	1000 l/ha (Berechnungsbasis) Berechnungsbasis

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Vor dem Austrieb				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen ---
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 28
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 10 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 5
Einsatzgebiet Weinbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weinreben (VITVI)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Pockenmilbe (ERPHVI, Eriophyes vitis)	Zur Befallsminderung
Kräuselmilbe (EPITVI, Calepitrimerus vitis)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
2	kg/ha			1.000	l/ha	1000 l/ha (Berechnungsbasis) Berechnungsbasis

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Nach dem Austrieb				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 1
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen ---
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 28
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 10 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Negative Einflüsse auf den Geschmack bei Tafeltrauben können nicht ausgeschlossen werden.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 6
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Birne (PYUCO)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Birnenpockenmilbe (ERPHPI, Eriophyes piri)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1,5	kg/ha/m Kronenhöhe			500	l/ha/m Kronenhöhe	500 l/ha/m Kronenhöhe
4,5	kg/ha	max.		500	l/ha/m Kronenhöhe	500 l/ha/m Kronenhöhe

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Vor der Blüte				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 2
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen oder Sprühen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Nicht-Ziel-Arthropoden ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 75% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 14 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Bei berostungsempfindlichen Kernobstsorten sind niedrigere Aufwandmengen anzuwenden und Anwendungen während der Blüte zu vermeiden.

Berostung bei empfindlichen Sorten möglich.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 7
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Schorf (VENTSP, Venturia sp.)	Zur Befallsminderung, mit befallsmindernder Wirkung gegen Spinnmilben

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
2,7	kg/ha/m Kronenhöhe			500	l/ha/m Kronenhöhe	500 l/ha/m Kronenhöhe
8	kg/ha	max.		500	l/ha/m Kronenhöhe	500 l/ha/m Kronenhöhe

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis				
	09	Grüne Blattspitzen überragen Knospenschuppen um ca. 5 mm	85	Fortgeschrittene Fruchtreife: Zunehmend sortentypische Intensität der Deckfarbe

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 14
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen oder Sprühen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Nicht-Ziel-Arthropoden ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 90% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

- Insgesamt nicht mehr als 14 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
- Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.
- Bei berostungsempfindlichen Kernobstsorten sind niedrigere Aufwandmengen anzuwenden und Anwendungen während der Blüte zu vermeiden.
- Berostung bei empfindlichen Sorten möglich.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 8
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Schorf (VENTSP, Venturia sp.)	Zur Befallsminderung, mit befallsmindernder Wirkung gegen Spinnmilben

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
27	g/100 m ² /m Kronenhöhe			5	l/100 m ² /m Kronenhöhe	5 l/100 m ² /m Kronenhöhe
80	g/100 m ²	max.		5	l/100 m ² /m Kronenhöhe	5 l/100 m ² /m Kronenhöhe

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis				
	09	Grüne Blattspitzen überragen Knospenschuppen um ca. 5 mm	85	Fortgeschrittene Fruchtreife: Zunehmend sortentypische Intensität der Deckfarbe

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 14
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich: Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 14 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.
Bei berostungsempfindlichen Kernobstsorten sind niedrigere Aufwandmengen anzuwenden und Anwendungen während der Blüte zu vermeiden.
Berostung bei empfindlichen Sorten möglich.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 9
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (PODOLE, Podosphaera leucotricha)	Mit befallsmindernder Wirkung gegen Spinnmilben

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
2,7	kg/ha/m Kronenhöhe			500	l/ha/m Kronenhöhe	500 l/ha/m Kronenhöhe
8	kg/ha	max.		500	l/ha/m Kronenhöhe	500 l/ha/m Kronenhöhe

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	09	Grüne Blattspitzen überragen Knospenschuppen um ca. 5 mm	85	Fortgeschrittene Fruchtreife: Zunehmend sortentypische Intensität der Deckfarbe

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 14
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen oder Sprühen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Nicht-Ziel-Arthropoden ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 90% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

- Insgesamt nicht mehr als 14 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
- Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.
- Bei berostungsempfindlichen Kernobstsorten sind niedrigere Aufwandmengen anzuwenden und Anwendungen während der Blüte zu vermeiden.
- Berostung bei empfindlichen Sorten möglich.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 10
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kernobst (3PMFC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (PODOLE, Podosphaera leucotricha)	Mit befallsmindernder Wirkung gegen Spinnmilben

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
27	g/100 m ² /m Kronenhöhe			5	l/100 m ² /m Kronenhöhe	5 l/100 m ² /m Kronenhöhe
80	g/100 m ²	max.		5	l/100 m ² /m Kronenhöhe	5 l/100 m ² /m Kronenhöhe

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	09	Grüne Blattspitzen überragen Knospenschuppen um ca. 5 mm	85	Fortgeschrittene Fruchtreife: Zunehmend sortentypische Intensität der Deckfarbe

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 14
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich: Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 14 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.
Bei berostungsempfindlichen Kernobstsorten sind niedrigere Aufwandmengen anzuwenden und Anwendungen während der Blüte zu vermeiden.
Berostung bei empfindlichen Sorten möglich.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 11
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Stachelbeeren (RIBUC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Amerikanischer Stachelbeermehltau (SPHRMU, Podosphaera mors-uvae)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
4	kg/ha			1.000	l/ha	1000 l/ha

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Nach dem Austrieb			
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 6
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 6 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 12
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Stachelbeeren (RIBUC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Amerikanischer Stachelbeermehltau (SPHRMU, Podosphaera mors-uvae)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
40	g/100 m ²			10	l/100 m ²	10 l/100 m ²

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Nach dem Austrieb			
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 6
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Für Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich: Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 6 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 13
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSPI, Erysiphe pisi)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1,5	kg/ha		400	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 3
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 14
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 3 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 14
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSPI, Erysiphe pisi)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
15	g/100 m ²		4	6	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 3
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 14
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Für Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich: Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 3 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 15
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gurke (CUMSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (Golovinomyces (Erysiphe) cichoracearum, Podosphaera (Sphaerotheca) fulginea)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
7,5	kg/ha		200	1.000	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt am Hauptspross entfaltet	87	70% der Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 6
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 3
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 6 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 16
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Gurke (CUMSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (Golovinomyces (Erysiphe) cichoracearum, Podosphaera (Sphaerotheca) fulginea)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
75	g/100 m ²		2	10	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt am Hauptspross entfaltet	87	70% der Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 6
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 3
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Für Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich: Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 6 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 17
Einsatzgebiet Hopfenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Hopfen (HUMLU)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (SPHRMA, Podosphaera macularis)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
7,5	kg/ha		600	3.000	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 10
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 6
Anwendungsart Spritzen oder Sprühen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 8
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Nicht-Ziel-Arthropoden ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 50% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 10 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 18
Einsatzgebiet Forst

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Eiche (QUESS)	Sämlinge und Jungpflanzen

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (MCRSAL, Microsphaera alphitoides)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1,2	kg/ha		200	600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Frühjahr bis Sommer				
Vorbeugende Behandlung				
Nach dem Austrieb				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 3
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 10
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 3 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 19
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera sp.)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
2,5	kg/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	600	1.200	l/ha	
3,75	kg/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	600	1.200	l/ha	
5	kg/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	600	1.200	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 15
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 6
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Nicht-Ziel-Arthropoden ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 50% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.

Insgesamt nicht mehr als 15 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 20
Einsatzgebiet Zierpflanzenbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zierpflanzenkulturen (3ORTC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echte Mehltäupilze (PODOSP, Podosphaera sp.)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
25	g/100 m ²	Pflanzenhöhe bis 50 cm	6	12	l/100 m ²	
37,5	g/100 m ²	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	6	12	l/100 m ²	
50	g/100 m ²	Pflanzenhöhe über 125 cm	6	12	l/100 m ²	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 15
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 6
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen ---
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Für Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich: Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
In die Gebrauchsanweisung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Pflanzenschutzmittelaufwand verträglich oder unverträglich ist.
Insgesamt nicht mehr als 15 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 21
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Topinambur (HELTU)	
Schwarzwurzel (SCVHI)	
Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) (3RSBC)	
Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) (3UMRC)	
Süßkartoffel (IPOBA)	
Haferwurzel (Weißwurzel) (TROPS)	
Orientalischer Bocksbart (TROPO)	
Rote Rüben (3BERC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echte Mehltapilze (PODOSP, Podosphaera sp.)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1,5	kg/ha			600	l/ha	600 l/ha

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 6
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 5
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist



Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

In Abhängigkeit von Kultur, Sorte und dem Anbauverfahren können Schäden an der zu behandelnden Kultur nicht ausgeschlossen werden. Vor einem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 6 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 22
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Topinambur (HELTU)	
Schwarzwurzel (SCVHI)	
Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler (Brassicaceae) (3RSBC)	
Wurzel- und Knollengemüse Doldengewächse (Apiaceae) (3UMRC)	
Süßkartoffel (IPOBA)	
Haferwurzel (Weißwurzel) (TROPS)	
Orientalischer Bocksbart (TROPO)	
Rote Rüben (3BERC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera sp.)	

Anwendungsbereich Haus- und Kleingartenbereich: Freiland
HuK Ja
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
15	g/100 m ²			6	l/100 m ²	6 l/100 m ²

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.			

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 6
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 5
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist



Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Für die Haus- und Kleingartenanwendungen: Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.
Für Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich: Schädlich für Nützlinge.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

In Abhängigkeit von Kultur, Sorte und dem Anbauverfahren können Schäden an der zu behandelnden Kultur nicht ausgeschlossen werden. Vor einem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 6 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 23
Einsatzgebiet Ackerbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zuckerrübe (BEAVA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSBE, Erysiphe betae)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Nein
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
7	kg/ha		200	500	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	39	Bestandesschluß: über 90% der Pflanzen benachbarter Reihen berühren sich	49	Rübenkörper hat erntefähige Größe erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.
Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Jahr und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 24
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Paprika (CPSAN)	
Melanzani (Auberginen) (SOLME)	
Tomaten (LYPES)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
7	kg/ha		200	1.000	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt am Hauptspross entfaltet	88	80% der Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 5
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 3
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar





Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.
Insgesamt nicht mehr als 5 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 25
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Paprika (CPSAN)	
Melanzani (Auberginen) (SOLME)	
Tomaten (LYPES)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (LEVETA, Leveillula taurica)	

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
3,5	kg/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	500	l/ha	500 l/ha	(Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm
5,25	kg/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	750	l/ha	750 l/ha	(Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
7	kg/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	1.000	l/ha	1000 l/ha	(Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt am Hauptspross entfaltet	88	80% der Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 5
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 3
Abverkaufsfrist



Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.
Insgesamt nicht mehr als 5 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 26
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zucchini (CUUPG)	
Garten-Kürbis (CUUPE)	
Patisson (CUUPM)	
Gurke (CUMSA)	
Melonen (CUMME)	
Riesenkürbis (CUUMA)	
Kürbis-Hybriden (CUUHY)	
Moschuskürbis (CUUMO)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (PODOSP, Podosphaera sp.)	
Echter Mehltau (GOLOSP, Golovinomyces sp.)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
7,5	kg/ha		200	1.000	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt am Hauptpross entfaltet	88	80% der Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 6
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen



Nachbaufrist in Tagen	---
Wartefrist in Tagen	3
Abverkaufsfrist	
Aufbrauchsfrist	
Kommentar	



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 6 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 27
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Zucchini (CUUPG)	
Garten-Kürbis (CUUPE)	
Patisson (CUUPM)	
Gurke (CUMSA)	
Melonen (CUMME)	
Riesenkürbis (CUUMA)	
Kürbis-Hybriden (CUUHY)	
Moschuskürbis (CUUMO)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (PODOSP, Podosphaera sp.)	
Echter Mehltau (GOLOSP, Golovinomyces sp.)	

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
3,75	kg/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	500	l/ha	500 l/ha	(Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm
5,63	kg/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	750	l/ha	750 l/ha	(Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
7,5	kg/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	1.000	l/ha	1000 l/ha	(Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt am Hauptspross entfaltet	88	80% der Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 6
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr



Zeitlicher Abstand in Tagen	7
Anwendungsart	Spritzen
Nachbaufrist in Tagen	---
Wartefrist in Tagen	3
Abverkaufsfrist	
Aufbrauchsfrist	
Kommentar	



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Insgesamt nicht mehr als 6 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 28
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Feuerbohne (Käferbohne) (PHSCO)	
Stangenbohne (PHSVX)	
Buschbohne (PHSVN)	
Linse (LENCU)	
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	Trocken
Mondbohne (Limabohne) (PHSLU)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (PODOSP, Podosphaera sp.)	
Echter Mehltau (ERYSSP, Erysiphe sp.)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
2	kg/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	400	l/ha	400 l/ha	(Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm
3	kg/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	600	l/ha	600 l/ha	(Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
4	kg/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	800	l/ha	800 l/ha	(Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet	79	Nahezu alle Früchte erreichen art-/sortenspezifische Fruchtgröße

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen



Nachbaufrist in Tagen	---
Wartefrist in Tagen	7
Abverkaufsfrist	
Aufbrauchsfrist	
Kommentar	



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.
Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Jahr und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 29
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Feuerbohne (Käferbohne) (PHSCO)	
Stangenbohne (PHSVX)	
Buschbohne (PHSVN)	
Linse (LENCU)	
Erbse (Gemüseerbse) (PIBSX)	
Mondbohne (Limabohne) (PHSLU)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (PODOSP, Podosphaera sp.)	
Echter Mehltau (ERYSSP, Erysiphe sp.)	

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
2	kg/ha	Pflanzenhöhe bis 50 cm	400	l/ha	400 l/ha	(Pflanzenhöhe bis 50 cm) Pflanzenhöhe bis 50 cm
3	kg/ha	Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm	600	l/ha	600 l/ha	(Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm
4	kg/ha	Pflanzenhöhe über 125 cm	800	l/ha	800 l/ha	(Pflanzenhöhe über 125 cm) Pflanzenhöhe über 125 cm

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	13	3. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet	79	Nahezu alle Früchte erreichen art-/sortenspezifische Fruchtgröße

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen



Nachbaufrist in Tagen	---
Wartefrist in Tagen	7
Abverkaufsfrist	
Aufbrauchsfrist	
Kommentar	



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.
Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Jahr und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 30
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Chicoree (inkl. Zuckerhut, Radicchio) (CICIF)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
4	kg/ha		400	800	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	11	1. Laubblatt entfaltet	49	Art-/sortentypische Grösse erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 3
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.
Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Jahr und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 31
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Chicoree (inkl. Zuckerhut, Radicchio) (CICIF)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
4	kg/ha		400	800	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	11	1. Laubblatt entfaltet	49	Art-/sortentypische Grösse erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 3
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.
Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Jahr und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 32
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Erdbeeren (FRAAN)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (PODOAP, Podosphaera aphanis)	Zur Befallsminderung

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
4	kg/ha		400	1.000	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	13	3. Laubblatt ist entfaltet	89	2. Pflücke: Weitere Früchte sortentypisch ausgefärbt

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 3
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 10
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 3 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 33
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Rosen (1ROSG)	Heckenrosen
Himbeeren (RUBID)	
Preiselbeeren (VACVI)	
Kultur-Heidelbeere (VACCO)	
Johannisbeerartiges Beerenobst (3RIBC)	
Loganbeeren (RUBLO)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (PODOSP, Podosphaera sp.)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
7	kg/ha		500	1.000	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.				
	07	Beginn des Spross- bzw. Knospenaustriebes	89	Vollreife: Art- /Sortentypische Fruchtausfärbung erreicht. Früchte bzw. Fruchtstände lösen sich relativ leicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7



Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Nicht-Ziel-Arthropoden ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 50% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Jahr und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 34
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Kräuter (3HERC)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echte Mehltaupilze (PODOSP, Podosphaera sp.)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
5	kg/ha		200	800	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	15	5. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet	49	Vegetatives Erntegut bzw. vegetative Vermehrung sorgane haben endgültige Größe erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 3
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
Zeitlicher Abstand in Tagen 10
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 3 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.
Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 35
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE)	
Süßkirsche (PRNAV)	
Marillen (PRNAR)	
Pflaumen (Zwetschken) (PRNDO)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (PODOTR, Podosphaera tridactyla)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
2,7	kg/ha/m Kronenhöhe	max. 7,5 kg/ha		500	l/ha/m Kronenhöhe	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	10	Erste Laubblätter spreizen sich ab; grüne Hüllblätter leicht geöffnet; Laubblätter schieben sich vor	85	Fortgeschrittene Fruchtausfärbung

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 10
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 10
Zeitlicher Abstand in Tagen mind. 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist



Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Nicht-Ziel-Arthropoden ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 90% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 10 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 36
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Nektarinen (PRNPN)	
Pfirsiche (PRNPS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (SPHRPA, Podosphaera pannosa)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
2,7	kg/ha/m Kronenhöhe	max. 7,5 kg/ha		500	l/ha/m Kronenhöhe	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	10	Erste Laubblätter spreizen sich ab; grüne Hüllblätter leicht geöffnet; Laubblätter schieben sich vor	85	Fortgeschrittene Fruchtausfärbung

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 10
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 10
Zeitlicher Abstand in Tagen mind. 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Nicht-Ziel-Arthropoden ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 90% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 10 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 37
Einsatzgebiet Obstbau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Weichsel (Sauerkirsche) (PRNCE)	
Nektarinen (PRNPN)	
Süßkirsche (PRNAV)	
Pfirsiche (PRNPS)	
Marillen (PRNAR)	
Pflaumen (Zwetschken) (PRNDO)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Schrotschusskrankheit (STIGCA, Stigmata carpophila)	

Anwendungsbereich Freiland
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
2,7	kg/ha/m Kronenhöhe	max. 7,5 kg/ha		500	l/ha/m Kronenhöhe	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	10	Erste Laubblätter spreizen sich ab; grüne Hüllblätter leicht geöffnet; Laubblätter schieben sich vor	85	Fortgeschrittene Fruchtausfärbung

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 10
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 10
Zeitlicher Abstand in Tagen mind. 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7



Abverkaufsfrist

Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Zum Schutz von Nicht-Ziel-Arthropoden ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 90% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Insgesamt nicht mehr als 10 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.

Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 38
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Karotten (DAUCS)	
Knollensellerie (APUGR)	
Pastinaken (PAVSA)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSHE, Erysiphe heraclei)	

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1,5	kg/ha			600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
	15	5. Laubblatt entfaltet	49	Dickenwachstum abgeschlossen; art-/sortentypische Form und Grösse der Rübe, Wurzel bzw. Knolle erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 4
Zeitlicher Abstand in Tagen mind. 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.
Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 39
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Radieschen (Rettich) (RAPS)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSCR, Erysiphe cruciferarum)	

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1,5	kg/ha			600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
	15	5. Laubblatt entfaltet	49	Dickenwachstum abgeschlossen; art-/sortentypische Form und Grösse der Rübe, Wurzel bzw. Knolle erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 4
Zeitlicher Abstand in Tagen mind. 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.
Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 40
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Schwarzwurzel (SCVHI)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSCI, Golovinomyces cichoracearum)	

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1,5	kg/ha			600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
	15	5. Laubblatt entfaltet	49	Dickenwachstum abgeschlossen; art-/sortentypische Form und Grösse der Rübe, Wurzel bzw. Knolle erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 4
Zeitlicher Abstand in Tagen mind. 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

--

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.
Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!



Indikationsdetail zu Thiovit Jet, 2632-0

Nr. 41
Einsatzgebiet Gemüsebau

Kultur/Objekt

Kultur/Objekt	Einschränkung
Rote Rübe (BEAVD)	

Schadfaktor

Schadfaktor	Einschränkung
Echter Mehltau (ERYSBE, Erysiphe betae)	

Anwendungsbereich Unter Glas
HuK Nein
Art. 51 Ja
Art. 53 Nein

Aufwandsmengen

Menge	Einheit	Erläuterungen	Wasser von	Wasser bis	Einheit	Erläuterungen
1,5	kg/ha			600	l/ha	

Anwendungszeitpunkt

Text	von BBCH-Stadium	von	bis BBCH-Stadium	bis
	15	5 Laubblätter entfaltet	49	Rübenkörper hat erntefähige Grösse erreicht

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung 4
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr 4
Zeitlicher Abstand in Tagen mind. 7
Anwendungsart Spritzen
Nachbaufrist in Tagen ---
Wartefrist in Tagen 7
Abverkaufsfrist
Aufbrauchsfrist

Kommentar



Kennzeichnungselemente gemäß den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) idgF. sowie weitere Auflagen und Hinweise

Sicherheitshinweise

P-Satz	Text
--------	------

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Sonstige Auflagen und Hinweise

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen.
Durch die Anwendung des Mittels kann eine Beeinträchtigung der Qualität der Ernteprodukte nicht ausgeschlossen werden.
Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften!

<http://www.baes.gv.at/impressum>